| がん種 | 非小細胞肺癌 | レジメン名 | CDDP+PEM+ペムブロリズマブ | 1コース日数 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|
| 対象疾患 | 切除不能非小細胞肺癌 | | 総コース数 | 4回まで | |

| | 投与順 | 薬剤 | 投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与スケジュール | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1日目 | 2日目 | 3日目 | | | | | 21日目 |
| 治療内容 | RP1 | メトクロプラミド | 10mg | 点滴静注 | 2時間 | ● | | | | | | | 休薬完了 |
| | | 硫酸Mg 20mEq/20mL | 0.4A | | | | | | | | | | |
| | | 生理食塩液 | 500mL | | | | | | | | | | |
| | RP2 | デキサメタゾン | 9.9mg | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | |
| | | パロノセトロン | 0.75mg | | | | | | | | | | |
| | | 生理食塩液 | 100mL | | | | | | | | | | |
| | RP3 | デキサメタゾン | 6.6mg | 点滴静注 | 30分 | | ● | ● | | | | | |
| | | メトクロプラミド | 10mg | | | | | | | | | | |
| | | 生理食塩液 | 50mL | | | | | | | | | | |
| | RP4 | ペムブロリズマブ | 200mg | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | |
| | | 生理食塩液 | 100mL | | | | | | | | | | |
| | RP5 | ペメトレキセド | 500mg/㎡ | 点滴静注 | 10分 | ● | | | | | | | |
| | | 生理食塩液 | 100mL | | | | | | | | | | |
| | RP6 | 生理食塩液 | 100mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | |
| | RP7 | シスプラチン | 75mg/㎡ | 点滴静注 | 2時間 | ● | | | | | | | |
| | | 生理食塩液 | 250mL | | | | | | | | | | |
| | RP8 | フロセミド | 20mg | 点滴静注 | 5分 | ● | | | | | | | |
| | | 生理食塩液 | 50mL | | | | | | | | | | |
| | RP9 | 生理食塩液 | 500mL | 点滴静注 | 2時間 | | ● | ● | | | | | |
| | RP10 | ソルデム3A | 500mL | 点滴静注 | 2時間 | | ● | ● | | | | | |
| | RP11 | メトクロプラミド | 10mg | 点滴静注 | 2時間 | ● | ● | ● | | | | | |
| | | 生理食塩液 | 500mL | | | | | | | | | | |
| 支持療法 | RP2開始時アプレピタント（125mg）内服<br>day2,3アプレピタント（80mg）内服 | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | 別途ビタミンB12筋注、パンビタンオーダー<br>4コース終了後はCDDP+PEM+ペムブロリズマブ（維持療法）へ移行<br>RP4：フィルターを通して投与 | | | | | | | | | | | | |