がん種	大腸癌	レジメン名	FOLFIRI+ベバシズマブ（インフューザーポンプ）	1コース日数	14
対象疾患	治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌		総コース数	病勢進行まで継続	

	投与順	薬剤	投与量	投与方法	投与時間	投与スケジュール							
						1日目	2日目	3日目	・・・	・・・	・・・	・・・	14日目
治療内容	RP1	生食シリンジ	10mL	ワンショット静注		●							
	RP2	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	●							
	RP3	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴静注	初回90分	●							
		生理食塩液	100mL										
	RP4	デキサメタゾン	9.9mg	点滴静注	30分	●							
		生理食塩液	50mL										
	RP5	グラニセトロン	3mg/100mL	点滴静注	30分	●							
	RP6	レボホリナート	200mg/㎡	点滴静注	2時間 RP7と同時	●							休薬完了
		5%ブドウ糖	250mL										
	RP7	イリノテカン	150mg/㎡	点滴静注	1.5時間 RP6と同時	●							
		5%ブドウ糖	250mL										
	RP8	フルオロウラシル	400mg/㎡	点滴静注	5分	●							
		生理食塩液	50mL										
	RP9	フルオロウラシル	2400mg/㎡	点滴静注	46時間	●							
		生理食塩液	※										
	RP10	ヘパリンNaロック	10mL	ワンショット静注				●					
支持療法	day2,3デキサメタゾン8mg内服考慮												
備考	※生食の量はフルオロウラシルの量に応じて調整 ベバシズマブ：尿蛋白2+以上で中止、初回90分、2回目60分、3回目30分投与可 イリノテカン：UGT1A1測定												