がん種	大腸癌	レジメン名	FOLFOXIRI（インフューザーポンプ）	1コース日数	14
対象疾患	治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌		総コース数	病勢進行まで継続	

	投与順	薬剤	投与量	投与方法	投与時間	投与スケジュール							
						1日目	2日目	3日目	・・・	・・・	・・・	・・・	14日目
治療内容	RP1	生食シリンジ	10mL	ワンショット静注		●							休薬完了
	RP2	デキサメタゾン	9.9mg	点滴静注	30分	●							
		パロノセトロン	0.75mg										
		生理食塩液	100mL										
	RP3	イリノテカン	150mg/㎡	点滴静注	1時間	●							
		5%ブドウ糖	250mL										
	RP4	レボホリナート	200mg/㎡	点滴静注	2時間 RP5と同時	●							
		5%ブドウ糖	250mL										
	RP5	オキサリプラチン	85mg/㎡	点滴静注	2時間 RP4と同時	●							
		5%ブドウ糖	250mL										
	RP6	フルオロウラシル	3000mg/㎡	点滴静注	46時間	●							
		生理食塩液	※										
	RP7	ヘパリンNaロック	10mL	ワンショット静注				●					
支持療法	RP2開始時アプレピタント（125mg）内服 day2,3アプレピタント（80mg）内服 day2,3,4,(5)デキサメタゾン8mg内服												
備考	※生食の量は5-FUの量に応じて調整 イリノテカン：UGT1A1測定												