がん種	大腸癌	レジメン名	FOLFIRI+アフリベルセプト（インフューザーポンプ）	1コース日数	14
対象疾患	治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌		総コース数	病勢進行まで継続	

	投与順	薬剤	投与量	投与方法	投与時間	投与スケジュール							
						1日目	2日目	3日目	・・・	・・・	・・・	・・・	14日目
治療内容	RP1	生食シリンジ	10mL	ワンショット静注		●							
	RP2	デキサメタゾン	9.9mg	点滴静注	30分	●							
		パロノセトロン	0.75mg										
		生理食塩液	50mL										
	RP3	アフリベルセプト	4mg/kg	点滴静注	1時間	●							
		生理食塩液	100mL										
	RP4	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	●							
	RP5	レボホリナート	200mg/㎡	点滴静注	2時間 RP6と同時	●							休薬完了
		5%ブドウ糖	250mL										
	RP6	イリノテカン	150mg/㎡	点滴静注	1.5時間 RP5と同時	●							
		5%ブドウ糖	250mL										
	RP7	フルオロウラシル	400mg/㎡	点滴静注	5分	●							
		生理食塩液	50mL										
	RP8	フルオロウラシル	2400mg/㎡	点滴静注	46時間	●							
		生理食塩液	※										
	RP9	ヘパリンNaロック	10mL	ワンショット静注				●					
支持療法	day2,3デキサメタゾン8mg内服考慮												
備考	※生食の量はフルオロウラシルの量に応じて調整 イリノテカン：UGT1A1測定 アフリベルセプト：尿蛋白測定、インラインフィルター使用												