がん種	大腸癌	レジメン名	CapeIRI+ベバシズマブ	1コース日数	21
対象疾患	治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌		総コース数	病勢進行まで継続	

	投与順	薬剤	投与量	投与方法	投与時間	投与スケジュール							
						1日目	2日目	3日目	・・・	14日目	15日目	・・・	21日目
治療内容	RP1	生食シリンジ	10mL	ワンショット静注		●							休薬完了
	RP2	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	●							
	RP3	ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴静注	初回90分	●							
		生理食塩液	100mL										
	RP4	デキサメタゾン	9.9mg	点滴静注	30分	●							
		グラニセトロン	3mg/100mL										
	RP5	イリノテカン	200mg/㎡	点滴静注	90分	●							
		5%ブドウ糖	250mL										
	RP6	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	●							
	RP7	カペシタビン	※	内服	分2朝夕食後		■	■	■	■	■		
支持療法	day2,3デキサメタゾン8mg内服考慮												
備考	ベバシズマブ：尿蛋白2+以上で中止、初回90分、2回目60分、3回目30分投与可 イリノテカン：UGT1A1測定 ※カペシタビン用量は下記参照、day1夕～day15朝まで内服 【800mg/㎡/回】 1.32㎡未満　1,800mg/日 1.32㎡以上1.69㎡未満　2,400mg/日 1.69㎡以上2.07㎡未満　3,000mg/日 2.07㎡以上　3,600mg/日												